


Jahresauswertung 2001  
Modul 17/2: TEP bei Coxarthrose

Qualitätsmerkmale

Sachsen Gesamt

Teiln. Abteilungen in Sachsen: 51  
Auswertungsversion: 11. Juli 2002  
Datensatzversionen: 2001 3.2 / 3.3  
Mindestanzahl Datensätze: 20  
Datenbankstand: 04. Juni 2002  
Druckdatum: 15. Juli 2002  
Nr. Gesamt-599

## Erläuterung der Grafiken




### Ergebnisse einzelner Abteilungen

Jede Abteilung wird durch eine Säule repräsentiert. Nullwerte sind durch kleinste Säulen dargestellt.

Bei den individuellen Krankenhausauswertungen ist die entsprechende Abteilung farbig hervorgehoben (hier z.B. 82%).

Es werden nur Abteilungen mit 20 oder mehr Fällen in der geprüften Grundgesamtheit dargestellt.

Statistiken geben keinen direkten Hinweis auf gute oder schlechte Qualität, sondern bedürfen noch fachkundiger Interpretation.



### Verteilung der Abteilungsergebnisse

Jede Säule repräsentiert die Gruppe all derjenigen Abteilungen, deren Ergebnis im entsprechenden Wertebereich liegen. Die Höhe der Säulen entspricht der Anzahl der Abteilungen, deren Ergebnis in diesem Bereich liegt.


Bei den individuellen Krankenhausauswertungen ist die Säule farbig hervorgehoben, zu deren Wertebereich das Ergebnis der Abteilung gehört (hier z.B. 5 Abteilungen mit einem Ergebnis > 80% und <=90%).

## Übersicht Qualitätsmerkmale Absolute Abweichung der Abteilungsergebnisse vom Referenzwert

[Derzeit sind keine Referenzwerte definiert.]

Qualitätsmerkmal	Fälle		Ergebnis Gesamt	Referenz- Bereich	Abweichung*	Seite
	Abteilung	Abteilung				
1 Indikation (Gruppe III)			85,6%	NN		1.1
2 OP-Dauer (min)			80,0	NN		1.2
3 Blutbedarf			51,1%	NN		1.3
4 Blutersatz mit Eigenblut			39,5%	NN		1.5
5 Intensivstation (ASA 3)			19,2%	NN		1.6
6 Postoperative Nachbehandlung			99,2%	NN		1.7
7 Gehfähigkeit mit Gehstützen bei Entlassung			99,4%	NN		1.8
8 Antibiotikaprophylaxe / Op-Dauer			92,2%	NN		1.9
9 Antibiotikaprophylaxe / Alter			88,9%	NN		1.10
10 Mobilität/Selbständigkeit bei Entlassung			97,9%	NN		1.11
11 postoperative Komplikationen (-)			11,8%	NN		1.12
12 postoperative Komplikationen / Verweildauer			19,0	NN		1.13
13 Wundinfektionen und OP-Dauer (-)			1,16%	NN		1.15
14 Gefäß- und/oder Nervenschäden (-)			0,7%	NN		1.16
15 Thromboembolische Komplikationen (-)			0,53%	NN		1.17
16 Wundhämatom / Nachblutungen (-)			2,87%	NN		1.18
17 Prothesenluxation (-)			1,18%	NN		1.19

### Abweichung der Abteilungsergebnisse



\*Abweichung vom Gesamtwert (entfällt in der Gesamtauswertung)

Bei Qualitätsmerkmalen, die mit (-) gekennzeichnet sind (z.B. bei Komplikationen), ist das Vorzeichen der Abweichung geändert, um gute Qualität immer als positiven Prozentwert darzustellen.

**Qualitätsmerkmal: Indikation**



**Qualitätsziel:** Oft eine angemessene Indikation

**Grundgesamtheit:** Alle Behandlungsfälle

	Gesamt 2001			
	Anzahl	%	Anzahl	%
<b>Gruppe I</b> Pat. mit 0 Min. schmerzfreiem Gehen, Ruheschmerz, Schmerzen seit >= 6 Monaten und Destruktion der Hüftpfanne oder Destruktion bzw. Dislokation des Hüftkopfes			1.661 / 4.557	36,5%
<b>Gruppe II</b> Pat. mit schmerzfreiem Gehen >= 20 Min., Schmerzen seit >= 6 Mon., regelmäßige Einnahme von Schmerzmitteln und Destruktion der Hüftpfanne oder Destruktion bzw. Dislokation des Hüftkopfes			169 / 4.557	3,71%
<b>Gruppe III</b> Pat. mit Schmerzen seit >= 6 Mon. und Destruktion der Hüftpfanne oder Destruktion bzw. Dislokation des Hüftkopfes			3.902 / 4.557	85,6%
Vertrauensbereich			84,6% - 86,6%	
Referenzbereich	>x %		>x %	

**Verteilung der Abteilungsergebnisse [Diagr. 1]:  
 Anteil Patienten mit Schmerzen seit mind. 6 Mon., Destruktion der Hüftpfanne oder Destruktion bzw. Dislokation des Hüftkopfes**

Minimum - Maximum der Abteilungswerte: 0,0% - 100,0%  
 Median - Mittelwert der Abteilungswerte: 93,7% - 87,0%



36 Abteilungen haben mehr als 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit  
 In der Gesamtauswertung ist keine Abteilung farblich hervorgehoben.

**Qualitätsmerkmal: OP-Dauer**

**Qualitätsziel:** Angemessene OP-Dauer

**Grundgesamtheit:** Gruppe I Alle Behandlungsfälle mit OP-Dauer > 0  
 Gruppe II Fälle mit Knochentransplantation oder Osteosynthese mit OP-Dauer > 0  
 Gruppe III Fälle ohne Knochentransplantation oder Osteosynthese mit OP-Dauer > 0



OP-Dauer (Merkmal,Dividend)	Gruppe I	Gruppe II	Gruppe III	Gesamt 2001		
				Gruppe I	Gruppe II	Gruppe III
Fälle				4.556	719	3.837
< 60min				662 14,5%	132 18,4%	530 13,8%
60-89 min				2.290 50,3%	367 51,0%	1.923 50,1%
90-119 min				1.100 24,1%	136 18,9%	964 25,1%
120-149 min				371 8,1%	52 7,2%	319 8,3%
150-179 min				79 1,73%	14 1,95%	65 1,69%
180-209 min				32 0,70%	12 1,67%	20 0,52%
210-239 min				14 0,31%	4 0,56%	10 0,26%
>= 240 min				8 0,18%	2 0,28%	6 0,16%
Median (min)				80,0	75,0	80,0
Referenzbereich (Median)	< x min			< x min		

**Verteilung der Abteilungsergebnisse [Diagr. 2]:**

**Median OP-Dauer (Gruppe I)**

Minimum - Maximum der Abteilungswerte: 50,0 min - 132,5 min

Median - Mittelwert der Abteilungswerte: 80,0 min - 83,7 min



36 Abteilungen haben mehr als 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit  
 In der Gesamtauswertung ist keine Abteilung farblich hervorgehoben.

**Qualitätsmerkmal: Blutbedarf**

**Qualitätsziel:** Selten Bluttransfusionen

**Grundgesamtheit:** Alle Behandlungsfälle



Bluttransfusionen (Eigen- oder Fremdblut)	Gesamt 2001			
	Anzahl	%	Anzahl	%
Pat. ohne Bluttransfusion			2.330 / 4.557	51,1%
Vertrauensbereich				49,7% - 52,6%
Referenzbereich		> x %		> x %
Pat. mit Bluttransfusion			2.227 / 4.557	48,9%
Pat. mit 1 Transfusionseinheit			434 / 4.557	9,5%
Pat. mit 2 Transfusionseinheiten			1.248 / 4.557	27,4%
Pat. mit > 2 Transfusionseinheiten			545 / 4.557	12,0%
Anteil Fremdbluteinheiten an Bluttransfusionseinheiten gesamt			3.139 / 5.193	60,4%
Vertrauensbereich				59,1% - 61,8%
Referenzbereich		< x %		< x %

**Verteilung der Abteilungsergebnisse [Diagr. 3]:**

**Anteil Patienten ohne Bluttransfusionen**



Minimum - Maximum der Abteilungswerte: 0,0% - 98,4%

Median - Mittelwert der Abteilungswerte: 48,1% - 50,8%



36 Abteilungen haben mehr als 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit  
 In der Gesamtauswertung ist keine Abteilung farblich hervorgehoben.

**Verteilung der Abteilungsergebnisse [Diagr. 4]:**  
**Anteil Fremdbluteinheiten an Bluttransfusionseinheiten gesamt**  
 Minimum - Maximum der Abteilungswerte: 4,5% - 100,0%  
 Median - Mittelwert der Abteilungswerte: 57,1% - 61,2%





35 Abteilungen haben mehr als 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit  
 In der Gesamtauswertung ist keine Abteilung farblich hervorgehoben.

**Qualitätsmerkmal: Blutersatz mit Eigenblut**

**Qualitätsziel:** Blutersatz häufig mit Eigenblut  
**Grundgesamtheit:** Alle Behandlungsfälle

	Gesamt 2001			
	Anzahl	%	Anzahl	%
Pat. mit Bluttransfusionen			2.227 / 4.557	48,9%
Anteil Eigenbluteinheiten an den gegebenen Transfusionseinheiten			2.054 / 5.193	39,5%
Vertrauensbereich				38,2% - 40,9%
Referenzbereich		>= x		>= x
Pat. mit >= 1 Transfusionseinheit Eigenblut u. ohne Fremdblut			970 / 4.557	21,3%
Pat. mit >= 1 Transfusionseinheit Fremdblut u. ohne Eigenblut			1.045 / 4.557	22,9%
Pat. mit >= 1 Transfusionseinheit Fremdblut und >= 1 Transfusionseinheit Eigenblut			212 / 4.557	4,65%

**Verteilung der Abteilungsergebnisse [Diagr. 5]:**  
**Anteil Eigenbluteinheiten an den gegebenen Transfusionseinheiten**  
 Minimum - Maximum der Abteilungswerte: 0,0% - 95,5%  
 Median - Mittelwert der Abteilungswerte: 42,9% - 38,8%



35 Abteilungen haben mehr als 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit  
 In der Gesamtauswertung ist keine Abteilung farblich hervorgehoben.

**Qualitätsmerkmal: Intensivstation**

**Qualitätsziel:** Aufenthalt auf der Intensivstation selten nötig

**Grundgesamtheit:** Alle Behandlungsfälle, unterteilt nach ASA



	Gesamt 2001	
	Aufenthalt auf der Intensivstation	%
Alle Behandlungsfälle	788 / 4.557	17,3%
ASA 1	69 / 612	11,3%
ASA 2	479 / 2.699	17,7%
ASA 3	232 / 1.210	19,2%
Vertrauensbereich		17,0% - 21,5%
Referenzbereich		<x%
ASA 4	8 / 35	23%
ASA 5	0 / 1	0%

**Verteilung der Abteilungsergebnisse [Diagr. 6]:**

**Anteil Pat. mit Aufenthalt auf Intensivstation bei ASA 3**

Minimum - Maximum der Abteilungswerte: 0,0% - 100,0%

Median - Mittelwert der Abteilungswerte: 6,5% - 18,2%



19 Abteilungen haben mehr als 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit  
 In der Gesamtauswertung ist keine Abteilung farblich hervorgehoben.



**Qualitätsmerkmal: Postoperative Nachbehandlung**

**Qualitätsziel:** Angemessene postoperative Nachbehandlung

**Grundgesamtheit:** Alle Behandlungsfälle

			Gesamt 2001	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Pat. mit med. Thromboseprophylaxe und postop. Röntgenbild a/p und tägl. Bewegungstherapie			4.402 / 4.557	96,6%
Pat. mit:				
medikamentöser Thromboseprophylaxe			4.521 / 4.557	99,2%
Vertrauensbereich				98,9% - 99,4%
Referenzbereich		>= x %		>= x %
postop. Röntgenbild a/p			4.489 / 4.557	98,5%
tägl. Bewegungstherapie			4.497 / 4.557	98,7%

**Verteilung der Abteilungsergebnisse [Diagr. 7]:**  
**Anteil Patienten mit medikamentöser Thromboseprophylaxe**  
 Minimum - Maximum der Abteilungswerte: 90,2% - 100,0%  
 Median - Mittelwert der Abteilungswerte: 100,0% - 99,1%



36 Abteilungen haben mehr als 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit  
 In der Gesamtauswertung ist keine Abteilung farblich hervorgehoben.

**Qualitätsmerkmal: Gehfähigkeit mit Gehstützen bei Entlassung**

**Qualitätsziel:** Hoher Anteil an Patienten, die bei der Entlassung mit Gehstützen gehen können



**Grundgesamtheit:** Alle Behandlungsfälle, unterteilt nach der Länge der postoperativen Verweildauer

Postop. Verweildauer (Tage)	selbst. gehfähige Patienten		Gesamt 2001	
	selbst. gehfähige Patienten	%	selbst. gehfähige Patienten	%
<= 15			1.290 / 1.298	99,4%
16-20			2.728 / 2.743	99,4%
Vertrauensbereich				99,1% - 99,7%
Referenzbereich		>x%		>x%
21-25			331 / 337	98,2%
>25			168 / 179	93,8%

**Verteilung der Abteilungsergebnisse [Diagr. 8]:**

**Anteil Pat., die bei Entlassung mit Gehstützen gehfähig sind, bei einer Aufenthaltsdauer von 16-20 Tagen**

Minimum - Maximum der Abteilungswerte: 92,6% - 100,0%  
 Median - Mittelwert der Abteilungswerte: 100,0% - 99,3%



28 Abteilungen haben mehr als 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit  
 In der Gesamtauswertung ist keine Abteilung farblich hervorgehoben.

**Qualitätsmerkmal: Antibiotikaprophylaxe und OP-Dauer**

**Qualitätsziel:** Im Verhältnis zur OP-Dauer angemessene Antibiotikaprophylaxe

**Grundgesamtheit:** Alle Behandlungsfälle, unterteilt nach OP-Dauer



OP-Dauer (Divisor)	Perioperative Antibiotikaprophylaxe				Gesamt 2001			
	keine	single shot	24 Std.	länger	keine	single shot	24 Std.	länger
Alle Fälle					30 0,66%	4.013 88,1%	313 6,9%	201 4,41%
< 60 min (663 Fälle Ges.)					4 0,60%	626 94,4%	19 2,87%	14 2,11%
60-89 min (2.290 Fälle Ges.)					16 0,70%	2.111 92,2%	82 3,58%	81 3,54%
Vertrauensbereich						91,0% - 93,3%		
Referenzbereich		<x%				<x%		
90-119 min (1.100 Fälle Ges.)					6 0,55%	920 83,6%	121 11,0%	53 4,82%
120-149 min (371 Fälle Ges.)					4 1,1%	277 74,7%	63 17,0%	27 7,3%
150-179 min (79 Fälle Ges.)					0 0%	53 67%	14 18%	12 15%
180-209 min (32 Fälle Ges.)					0 0%	14 44%	9 28%	9 28%
210-239 min (14 Fälle Ges.)					0 0%	7 50%	3 21%	4 29%
>= 240min (8 Fälle Ges.)					0 0%	5 62%	2 25%	1 12%

**Verteilung der Abteilungsergebnisse [Diagr. 9]:**

**Anteil Pat. mit single shot Antibiotikaprophylaxe bei einer OP-Dauer zwischen 60 und 90 min.**

Minimum - Maximum der Abteilungswerte: 46,1% - 100,0%

Median - Mittelwert der Abteilungswerte: 95,1% - 90,2%



26 Abteilungen haben mehr als 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit  
 In der Gesamtauswertung ist keine Abteilung farblich hervorgehoben.

**Qualitätsmerkmal: Antibiotikaprophylaxe und Alter**

**Qualitätsziel:** Im Verhältnis zum Alter angemessene Antibiotikaprophylaxe

**Grundgesamtheit:** Alle Behandlungsfälle, unterteilt nach Alter



Alter	Perioperative Antibiotikaprophylaxe				Gesamt 2001			
	keine	single shot	24 Std.	länger	keine	single shot	24 Std.	länger
Alle Fälle					30 0,66%	4.013 88,1%	313 6,9%	201 4,41%
<= 30 Jahre (22 Fälle Ges.)					0 0%	15 68%	6 27%	1 5%
31-60 Jahre (1.015 Fälle Ges.)					5 0,49%	869 85,6%	104 10,2%	37 3,65%
> 60 Jahre (3.520 Fälle Ges.)					25 0,71%	3.129 88,9%	203 5,8%	163 4,63%
Vertrauensbereich						87,8% - 89,9%		
Referenzbereich						<= x %		

**Verteilung der Abteilungsergebnisse [Diagr. 10]:**

**Anteil Pat. > 60 Jahre mit Antibiotikaprophylaxe single shot**

Minimum - Maximum der Abteilungswerte: 28,9% - 100,0%

Median - Mittelwert der Abteilungswerte: 94,0% - 87,6%



35 Abteilungen haben mehr als 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit  
 In der Gesamtauswertung ist keine Abteilung farblich hervorgehoben.

**Qualitätsmerkmal: Mobilität/Selbständigkeit bei Entlassung**



**Qualitätsziel:** Hoher Anteil an Patienten, die bei der Entlassung/Verlegung mobil und selbständig sind

**Grundgesamtheit:** Alle Behandlungsfälle mit folgenden Entlassungsgründen  
 - Behandlung regulär beendet  
 - Behandlung beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen  
 - Verlegung in ein anderes Krankenhaus  
 - Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung

	Anzahl	%	Gesamt 2001	
			Anzahl	%
Pat. bei denen Treppensteigen, selbständig Gehen u. selbständige hygienische Versorgung nicht möglich			20 / 4.473	0,45%
Pat. bei denen Treppensteigen, selbständig Gehen u. selbständige hygienische Versorgung möglich			4.381 / 4.473	97,9%
Vertrauensbereich				97,5% - 98,3%
Referenzbereich		>= x%		>= x%
Pat. bei denen selbst. Gehen möglich, Treppensteigen u. selbständige hygienische Versorgung nicht möglich			4 / 4.473	0,09%
Pat. bei denen Treppensteigen und selbständig Gehen möglich, selbst. hygienische Versorgung nicht möglich			9 / 4.473	0,20%
Pat. bei denen selbst. Gehen und selbst. hygienische Versorgung möglich, Treppensteigen nicht möglich			45 / 4.473	1,01%
Pat. bei denen Treppensteigen, selbständig Gehen und selbständige hygienische Versorgung <b>operationsbedingt</b> nicht möglich			1 / 4.473	0,02%
Pat. bei denen selbständig Gehen möglich, Treppensteigen u. selbständige hygienische Versorgung <b>operationsbedingt</b> nicht möglich			0 / 4.473	0,00%
Pat. bei denen Treppensteigen und selbständiges Gehen möglich, selbständige hygienische Versorgung <b>operationsbedingt</b> nicht möglich			2 / 4.473	0,04%
Pat. bei denen selbständiges Gehen u. selbständige hygienische Versorgung möglich, Treppensteigen <b>operationsbedingt</b> nicht möglich			22 / 4.473	0,49%

**Verteilung der Abteilungsergebnisse [Diagr. 11]: Anteil Pat., bei denen Treppensteigen, selbständiges Gehen und hygienische Versorgung bei Entlassung möglich.**

Minimum - Maximum der Abteilungswerte: 88,6% - 100,0%  
 Median - Mittelwert der Abteilungswerte: 98,0% - 97,8%



35 Abteilungen haben mehr als 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit  
 In der Gesamtauswertung ist keine Abteilung farblich hervorgehoben.

**Qualitätsmerkmal: Postoperative Komplikationen**

**Qualitätsziel:** Selten postoperative Komplikationen:  
 Prothesenluxation, Pneumonie, kardiovaskuläre Komplikation,  
 tiefe Bein- / Beckenvenenthrombose, Lungenembolie, Wundinfektion/Abszeßbildung,  
 Wundhämatom/Nachblutung, Dekubitus, Sonstige

**Grundgesamtheit:** Alle Behandlungsfälle



	Gesamt 2001			
	Anzahl	%	Anzahl	%
Prothesenluxation			54 / 4.557	1,18%
Pneumonie			20 / 4.557	0,44%
kardiovask. Komplikation			62 / 4.557	1,36%
tiefe Bein-/Beckenvenenthrombose			21 / 4.557	0,46%
Lungenembolie			4 / 4.557	0,09%
Wundinfektion / Abszeßbildung			53 / 4.557	1,16%
Wundhämatom / Nachblutung			131 / 4.557	2,87%
Gefäß- u./o. Nervenschäden			31 / 4.557	0,68%
Dekubitus			50 / 4.557	1,10%
Sonstige			147 / 4.557	3,23%
Fälle mit mind. einer postop. Komplikation			540 / 4.557	11,8%
Vertrauensbereich				10,9% - 12,8%
Referenzbereich		< x %		< x %

**Verteilung der Abteilungsergebnisse [Diagr. 12]:**

**Anteil Pat. mit mind. einer postop. Komplikation**

Minimum - Maximum der Abteilungswerte: 2,6% - 32,4%

Median - Mittelwert der Abteilungswerte: 10,9% - 12,2%



36 Abteilungen haben mehr als 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit  
 In der Gesamtauswertung ist keine Abteilung farblich hervorgehoben.

**Qualitätsmerkmal: Postoperative Komplikationen und postoperative Verweildauer**

**Qualitätsziel:** Angemessene postoperative Verweildauer bei Patienten mit postoperativen Komplikationen

**Grundgesamtheit:** Alle Behandlungsfälle



	Anzahl	Postop. Verweildauer Median (Tage)	Gesamt 2001	
			Anzahl	Postop. Verweildauer Median (Tage)
Pat. mit mind. einer postoperativen Komplikation			540	19,0
Referenzbereich		>= x Tage		>= x Tage
Prothesenluxation			54	18,0
Pneumonie			20	19,0
kardiovaskuläre Komplikationen			62	18,0
Tiefe Bein-/Beckenvenenthrombose			21	21,0
Lungenembolie			4	26,5
Harnwegsinfekt			42	17,0
Wundinfektion/Abszeßbildung			53	29,0
Wundhämatom/Nachblutung			131	20,0
Gefäß- und/oder Nervenschäden			31	17,0
Dekubitus			50	18,0
sonstige Komplikationen			147	18,0
Wundinfektion/Abszeßbildung ohne Wundhämatom/Nachblutung			48	28,0
Wundhämatom/Nachblutung ohne Wundinfektion/Abszeßbildung			126	20,0
Wundinfektion/Abszeßbildung und Wundhämatom/Nachblutung			5	38,0
Pat. ohne postop. Komplikationen			4.017	17,0

**Verteilung der Abteilungsergebnisse [Diagr. 13]:**

**Median der postoperativen Verweildauer bei Patienten mit mindestens einer postoperativen Komplikation**

Minimum - Maximum der Abteilungswerte: 17,0 Tage - 22,0 Tage

Median - Mittelwert der Abteilungswerte: 19,0 Tage - 18,9 Tage



9 Abteilungen haben mehr als 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit  
In der Gesamtauswertung ist keine Abteilung farblich hervorgehoben.



**Qualitätsmerkmal: Wundinfektionen und OP-Dauer**

**Qualitätsziel:** Abhängig von der OP-Dauer selten Wundinfektionen

**Grundgesamtheit:** Alle Behandlungsfälle, unterteilt nach OP-Dauer

OP-Dauer	Pat. mit Wundinfektion/Abszeßbildung		Gesamt 2001	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Alle Behandlungsfälle			53 / 4.557	1,16%
Vertrauensbereich				0,9% - 1,5%
Referenzbereich		<= x		<= x
< 60 min			7 / 663	1,06%
>= 60 min			23 / 2.290	1,00%
>= 90 min			16 / 1.100	1,45%
>= 120 min			4 / 371	1,1%
>= 150 min			2 / 79	3%
>= 180 min			0 / 32	0%
>= 210 min			1 / 14	7%
>= 240 min			0 / 8	0%

**Verteilung der Abteilungsergebnisse [Diagr. 14]:**  
**Anteil Pat. mit Wundinfektion**  
 Minimum - Maximum der Abteilungswerte: 0,0% - 7,1%  
 Median - Mittelwert der Abteilungswerte: 0,6% - 1,1%



36 Abteilungen haben mehr als 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit  
 In der Gesamtauswertung ist keine Abteilung farblich hervorgehoben.

**Qualitätsmerkmal: Gefäß- und/oder Nervenschäden**

**Qualitätsziel:** Selten Gefäß- und/oder Nervenschäden

**Grundgesamtheit:** Alle Behandlungsfälle



	Gesamt 2001	
	Anzahl	%
Pat. mit Gefäß- und/oder Nervenschäden	31 / 4.557	0,7%
Vertrauensbereich		0,5% - 1,0%
Referenzbereich	< x %	< x %

**Verteilung der Abteilungsergebnisse [Diagr. 15]:**

**Anteil Pat. mit Gefäß- oder Nervenschäden**

Minimum - Maximum der Abteilungswerte: 0,0% - 4,8%

Median - Mittelwert der Abteilungswerte: 0,0% - 0,6%



36 Abteilungen haben mehr als 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit  
 In der Gesamtauswertung ist keine Abteilung farblich hervorgehoben.

**Qualitätsmerkmal: Thromboembolische Komplikationen**

**Qualitätsziel:** Selten thromboembolische Komplikationen

**Grundgesamtheit:** Alle Behandlungsfälle, unterteilt nach OP-Dauer



Patienten mit thromboemb. Komplikationen bei OP-Dauer	Gesamt 2001	
	Med. Thromboseproph. mit	Med. Thromboseproph. ohne
< 60 min		0 / 656 0,00%
>= 60 min		13 / 2.278 0,57%
>= 90 min		7 / 1.092 0,64%
>= 120 min		3 / 365 0,8%
>= 150 min		1 / 78 1%
>= 180 min		0 / 31 0%
>= 210 min		0 / 13 0%
>= 240 min		0 / 8 0
Alle Behandlungsfälle		24 / 4.521 0,53%
Vertrauensbereich		0,3% - 0,8%
Referenzbereich	<= x %	<= x %

**Verteilung der Abteilungsergebnisse [Diagr. 16]:**

**Anteil Pat. mit thromboembolischen Komplikationen bei med. Thromboseprophylaxe**

Minimum - Maximum der Abteilungswerte: 0,0% - 3,2%

Median - Mittelwert der Abteilungswerte: 0,2% - 0,6%



36 Abteilungen haben mehr als 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit  
 In der Gesamtauswertung ist keine Abteilung farblich hervorgehoben.



**Qualitätsmerkmal: Wundhämatome / Nachblutungen**

**Qualitätsziel:** Selten Wundhämatome/Nachblutungen

**Grundgesamtheit:** Alle Behandlungsfälle, unterteilt nach OP-Dauer

Patienten mit Wundhämatom/Nachblutung bei OP-Dauer			Gesamt 2001	
	Anzahl	%	Anzahl	%
< 60min			11 / 663	1,66%
>= 60min			71 / 2.290	3,10%
>= 90min			30 / 1.100	2,73%
>= 120min			15 / 371	4,0%
>= 150min			2 / 79	3%
>= 180min			1 / 32	3%
>= 210min			0 / 14	0%
>= 240min			1 / 8	12%
Alle Patienten			131 / 4.557	2,87%
Vertrauensbereich				2,4% - 3,4%
Referenzbereich		<= x %		<= x %

**Verteilung der Abteilungsergebnisse [Diagr. 17]:  
 Anteil Patienten mit Wundhämatom/Nachblutung**  
 Minimum - Maximum der Abteilungswerte: 0,0% - 14,5%  
 Median - Mittelwert der Abteilungswerte: 2,6% - 3,6%



36 Abteilungen haben mehr als 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit  
 In der Gesamtauswertung ist keine Abteilung farblich hervorgehoben.

**Qualitätsmerkmal: Prothesenluxation**

**Qualitätsziel:** Selten Prothesenluxation

**Grundgesamtheit:** Alle Behandlungsfälle, unterteilt nach OP-Zugang



	Prothesenluxation		Gesamt 2001	
	mit	ohne	mit	ohne
Alle Patienten			54 / 4.557 1,18%	4.503 / 4.557 98,8%
Vertrauensbereich	█		0,9% - 1,5%	
Referenzbereich	<= x %		<= x %	
Anterolateraler Zugang			25 / 1.619 1,54%	1.594 / 1.619 98,5%
Lateraler Zugang			22 / 1.667 1,32%	1.645 / 1.667 98,7%
Transglutealer Zugang			7 / 1.038 0,67%	1.031 / 1.038 99,3%
Posteriorer Zugang			0 / 230 0,0%	230 / 230 100,0%
Transfemorale Zugang			0 / 1 0%	1 / 1 100%
Anderer Zugang			0 / 2 0%	2 / 2 100%

**Verteilung der Abteilungsergebnisse [Diagr. 18]:**

**Anteil Patienten mit Prothesenluxation**

Minimum - Maximum der Abteilungswerte: 0,0% - 5,4%

Median - Mittelwert der Abteilungswerte: 0,8% - 1,2%



36 Abteilungen haben mehr als 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit  
 In der Gesamtauswertung ist keine Abteilung farblich hervorgehoben.

Jahresauswertung 2001  
Modul 17/2: TEP bei Coxarthrose

Basisauswertung

Sachsen Gesamt


Teiln. Abteilungen in Sachsen: 51  
Auswertungsversion: 11. Juli 2002  
Datensatzversionen: 2001 3.2 / 3.3  
Mindestanzahl Datensätze: 20  
Datenbankstand: 04. Juni 2002  
Druckdatum: 15. Juli 2002  
Nr. Gesamt-599

**Basisdaten**

	Gesamt 2001		Gesamt 2000	
	Anzahl	%	Anzahl	%
<b>Anzahl importierter Datensätze</b>				
1. Quartal	1.113	24,4	1.350	23,7
2. Quartal	1.328	29,1	1.529	26,9
3. Quartal	1.314	28,8	1.414	24,9
4. Quartal	802	17,6	1.395	24,5
Gesamt	4.557		5.688	

	Gesamt 2001		Gesamt 2000	
	Anzahl	%	Anzahl	%
<b>Fallpauschalen-Nummer</b> FP 17.061 Coxarthrose: Einbau einer Hüftgelenks-Totalendoprothese bei Coxarthrose, Versorgung bis Abschluss Wundheilung (z.B. Entfernung von Fäden/Klammern), mindestens jedoch bis Abschluss der Behandlung indikationsspezifischer Komplikationen	4.482	98,3	5.640	99,2
<b>Sonderentgelt-Nummer</b> SE 17.07 Einbau einer Hüftgelenks-Totalendoprothese bei Coxarthrose	75	1,65	48	0,84

Verteilung der Fallpauschalen / Sonderentgelte



**Behandlungszeiten**

	Gesamt 2001			Gesamt 2000		
	Anzahl	Anzahl		Anzahl	Anzahl	
<b>Vorstationäre Behandlung (in Tagen)</b>						
Anzahl der Patienten		754		816		
Median		1,0		1,0		
Minimum - Durchschnitt - Maximum		1,0	1,1 19,0	1,0	1,2	15,0
<b>Präoperative Verweildauer (in Tagen)</b>						
Anzahl der Patienten		4.556		5.688		
Median		1,0		1,0		
Minimum - Durchschnitt - Maximum		0,0	3,2 385,0	0,0	2,3	209,0
<b>Postoperative Verweildauer (in Tagen)</b>						
Anzahl der Patienten		4.557		5.688		
Median		17,0		17,0		
Minimum - Durchschnitt - Maximum		0,0	17,4 155,0	0,0	17,5	124,0
<b>Nachstationäre Behandlung (in Tagen)</b>						
Anzahl der Patienten		150		106		
Median		1,0		1,0		
Minimum - Durchschnitt - Maximum		1,0	1,0 6,0	1,0	2,0	7,0
<b>Stationäre Aufenthaltsdauer (in Tagen)</b>						
Anzahl der Patienten		4.555		5.688		
Median		19,0		19,0		
Minimum - Durchschnitt - Maximum		1,0	20,4 385,0	1,0	19,7	219,0
<b>Aufenthaltsdauer inkl. vor- und nachstationärer Behandlung (in Tagen)</b>						
Anzahl der Patienten		4.555		5.688		
Median		19,0		19,0		
Minimum - Durchschnitt - Maximum		1,0	20,7 386,0	1,0	19,9	220,0

**Diagnosen**


				Gesamt 2001			Gesamt 2000		
	ICD	Anzahl	%	ICD	Anzahl	%	ICD	Anzahl	%
<b>Einweisungsdiagnose</b>									
Bezug: Alle Fallpauschalen-Fälle mit angegebener Einweisungsdiagnose									
Liste der 8 häufigsten Diagnosen									
				M16.1	1.823	50,0	M16.1	437	37,7
				M16.0	477	13,1	M16.9	324	28,0
				M16.9	426	11,7	M16.0	157	13,5
				M16.3	304	8,3	M16.3	73	6,3
				M16.7	302	8,3	M16.7	66	5,7
				M16.2	152	4,17	M16.2	37	3,19
				M16.5	55	1,51	M16.6	23	1,98
				M16.6	47	1,29	M16.5	13	1,12
<b>Aufnahmediagnose</b>									
Bezug: Alle Fallpauschalen-Fälle mit angegebener Aufnahmediagnose									
Liste der 8 häufigsten Diagnosen									
				M16.1	1.894	49,1	M16.1	542	35,6
				M16.9	531	13,8	M16.9	529	34,8
				M16.0	467	12,1	M16.0	189	12,4
				M16.3	325	8,4	M16.3	75	4,93
				M16.7	312	8,1	M16.7	70	4,60
				M16.2	153	3,96	M16.2	39	2,56
				M16.5	59	1,53	M16.6	23	1,51
				M16.6	48	1,24	M16.5	15	0,99
<b>Entlassungsdiagnose</b>									
Bezug: Alle Fallpauschalen-Fälle mit angegebener Entlassungsdiagnose									
Liste der 8 häufigsten Diagnosen									
				M16.1	1.913	49,2	M16.1	540	35,5
				M16.0	511	13,1	M16.9	526	34,6
				M16.9	461	11,8	M16.0	171	11,2
				M16.3	352	9,1	M16.7	80	5,3
				M16.7	317	8,1	M16.3	79	5,2
				M16.2	165	4,24	M16.2	57	3,75
				M16.5	57	1,47	M16.6	27	1,78
				M16.6	51	1,31	M16.5	12	0,79

	Gesamt 2001			Gesamt 2000					
	ICD	Anzahl	%	ICD	Anzahl	%			
<b>Einweisungsdiagnose</b> Bezug: Alle Sonderentgelt-Fälle mit angegebener Einweisungsdiagnose Liste der 8 häufigsten Diagnosen				M16.0	17	30	M16.9	3	38
				M16.2	13	23	M16.0	2	25
				M16.1	12	21	S72.1	1	12
				M16.3	7	12	M16.2	1	12
				M16.9	4	7	M16.1	1	12
				M87.05	1	2			
				M84.15	1	2			
				M16.7	1	2			
<b>Aufnahmediagnose</b> Bezug: Alle Sonderentgelt-Fälle mit angegebener Aufnahmediagnose Liste der 8 häufigsten Diagnosen				M16.1	13	28	M16.9	4	44
				M16.0	11	24	M16.0	2	22
				M16.9	8	17	S72.1	1	11
				M16.2	6	13	M16.2	1	11
				M16.3	5	11	M16.1	1	11
				M84.15	2	4			
				M87.05	1	2			
<b>Entlassungsdiagnose</b> Bezug: Alle Sonderentgelt-Fälle mit angegebener Entlassungsdiagnose Liste der 8 häufigsten Diagnosen				M16.0	12	23	M16.9	3	33
				M16.1	11	21	M16.1	2	22
				M16.3	9	17	M16.0	2	22
				M16.2	9	17	M16.6	1	11
				M16.9	7	13	M16.2	1	11
				M16.7	2	4			
				M87.05	1	2			
				M16.5	1	2			

**Verteilung der Operationstechniken (Voroperation)**

	Gesamt 2001			Gesamt 2000				
	OPS	Anzahl	%	OPS	Anzahl	%		
<b>Liste der 5 häufigsten Angaben</b> bezogen auf alle Fälle mit Angabe der OP-Technik bei der Voroperation				5-781.1f	15	9,8		
				5-820.00	11	7,2		
				5-820.01	7	4,6		
				5-820.0	6	3,9		
				5-781.y	6	3,9		
						5-820.0	51	19,6
						5-781.19	25	9,6
						5-781.89	15	5,8
						5-829.0	9	3,5
						5-786.5	7	2,7


**Verteilung der Operationstechniken (Voroperation)**



**Verteilung der Operationstechniken**

	Gesamt 2001			Gesamt 2000				
	OPS	Anzahl	%	OPS	Anzahl	%		
<b>Liste der 5 häufigsten Angaben</b>				5-820.00	2.118	48,2		
				5-820.01	846	19,2		
				5-820.02	760	17,3		
				5-820.0	544	12,4		
				5-820.20	75	1,71		
						5-820.0	4.614	94,8
						5-820.2	228	4,68
						5-820.02	17	0,35
						5-820.01	8	0,16
						5-820.0y	1	0,02


**Verteilung der Operationstechniken**



**Patienten**

	Gesamt 2001		Gesamt 2000		
	Anzahl	%	Anzahl	%	
<b>Altersverteilung (in Jahren)</b>					
< 20	0	0,00	3	0,05	
20 - 39	68	1,50	97	1,71	
40 - 59	848	18,6	1.130	19,9	
60 - 79	3.156	69,4	4.005	70,6	
80 - 89	457	10,1	431	7,6	
>= 90	18	0,40	10	0,18	
<b>Alter (Jahre)</b>					
Anzahl der Patienten	4.547		5.676		
Median	68,0		67,0		
Minimum - Durchschnitt - Maximum	21,0	67,2	1,0	66,4	94,0
<b>Geschlecht</b>					
männlich	1.628	35,7	1.878	33,0	
weiblich	2.929	64,3	3.810	67,0	
<b>Einstufung nach ASA-Klassifikation</b>					
1: normaler, ansonsten gesunder Patient	612	13,4	701	12,3	
2: mit leichter Allgemeinerkrankung	2.699	59,2	3.253	57,2	
3: mit schwerer Allgemeinerkrankung und Leistungseinschränkung	1.210	26,5	1.650	29,0	
4: mit inaktivierender Allgemeinerkrankung, ständige Lebensbedrohung	35	0,77	82	1,44	
5: moribunder Patient	1	0,02	2	0,04	

**Verteilung der Einstufung nach ASA-Klassifikation**



### Präoperative Anamnese

	Gesamt 2001				Gesamt 2000		
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	
<b>Schmerzfrees Gehen (in Minuten)</b>							
Anzahl der Patienten			4.554		5.683		
Median			3,5		1,0		
Minimum - Durchschnitt - Maximum			0,0	9,0 500,0	0,0	8,6	360,0
<b>Schmerzdauer (in Monaten)</b>							
Anzahl der Patienten			4.557		5.682		
Median			24,0		24,0		
Minimum - Durchschnitt - Maximum			0,0	36,8 99,0	0,0	38,8	99,0
<b>Medikamenteneinnahme aufgrund von Schmerzen</b>							
Anzahl der Patienten			3.996	87,7	4.865	85,5	
davon							
bei Bedarf			2.164	54,1	2.767	56,9	
regelmäßig			1.832	45,8	2.098	43,1	
<b>Abstand Vorop. - Operation (in Jahren)</b>							
Anzahl der Patienten			166		371		
Median			6		4		
Minimum - Durchschnitt - Maximum			0	13 50	0	11	70
<b>Befund kontralaterale Seite</b>							
ohne pathologischen Befund			2.220	48,7	2.655	46,7	
Schmerzen			1.343	29,5	1.794	31,5	
Voroperation			924	20,3	1.146	20,1	
Voroperation und Schmerzen			70	1,54	93	1,64	

### Präoperative Diagnostik

	Gesamt 2001				Gesamt 2000		
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	
<b>Bewegungsausmaß passiv mit Neutral-Null Methode bestimmt</b>							
Anzahl der Patienten			4.423	97,1	5.530	97,2	
davon							
<b>Auswertbare Winkelmaße</b>			4.398	99,4	5.491	99,3	
<b>Winkel Extension/Flexion (Grad)</b>							
Anzahl der Patienten			4.085		5.309		
Median			80,0		80,0		
Minimum - Durchschnitt - Maximum			0,0	77,5 190,0	0,0	75,9	160,0
<b>Winkel Ab-/Adduktion (Grad)</b>							
Anzahl der Patienten			4.064		5.059		
Median			25,0		25,0		
Minimum - Durchschnitt - Maximum			0,0	26,9 130,0	0,0	26,9	140,0
<b>Winkel Außen-/Innenrotation (Grad)</b>							
Anzahl der Patienten			3.724		4.576		
Median			15,0		15,0		
Minimum - Durchschnitt - Maximum			0,0	17,8 140,0	0,0	17,6	140,0
<b>Röntgenbefunde</b>							
Destruktion der Hüftpfanne			3.464	76,0	4.229	74,3	
Destruktion des Hüftkopfes			3.901	85,6	4.626	81,3	
Dislokation des Hüftkopfes			685	15,0	1.307	23,0	
keine Angabe eines pathol. Röntgenbefunds			537		875		

**Operation**

	Gesamt 2001		Gesamt 2000	
	Anzahl	%	Anzahl	%
<b>Medikamentöse Thromboseprophylaxe</b>				
Anzahl der Patienten	4.521	99,2	5.640	99,2
<b>Periop. Antibiotikaprophylaxe</b>				
Anzahl der Patienten	4.527	99,3	5.649	99,3
davon				
single shot	4.013	88,7	4.842	85,7
24 Std.	313	6,9	495	8,8
länger	201	4,44	312	5,5
<b>Anästhesie</b>				
Allgemeinanästhesie	2.541	55,8	2.931	51,5
<b>Regionalanästhesie</b>				
vom Operateur	46	1,01	65	1,14
vom Anästhesisten	2.116	46,4	2.991	52,6
keine	2.395	52,6	2.632	46,3
<b>Regional- und Allgemeinanästhesie</b>				
Anzahl der Patienten	148	3,25	301	5,3
Keine Angabe Anästhesie	2		2	
<b>OP-Team</b>				
Operateur hat Facharztstatus	3.830	84,0	4.619	81,2
<b>1. Assistent</b>				
Facharzt	2.678	58,8	3.349	58,9
Arzt in Weiterbildung	1.762	38,7	2.101	36,9
kein ärztlicher Assistent	117	2,57	238	4,18
<b>OP-Pflegekraft</b>				
mit Krankenpflegeexamen	4.506	98,9	5.612	98,7
ohne Krankenpflegeexamen	38	0,83	61	1,07
keine	13	0,29	15	0,26
<b>Bluttransfusion</b>				
Behandlungsfälle mit Bluttransfusion	2.227	48,9	3.205	56,3
davon				
<b>Eigenblut</b>	1.182	53,1	1.888	58,9
<b>Fremdblut</b>	1.257	56,4	1.703	53,1
<b>Eigenblut: Anz. Transfusionseinheiten</b>				
Median	2,0		2,0	
Minimum - Durchschnitt - Maximum	1,0	1,7	4,0	1,0
1,9			85,0	
<b>Fremdblut: Anz. Transfusionseinheiten</b>				
Median	2,0		2,0	
Minimum - Durchschnitt - Maximum	1,0	2,5	23,0	1,0
2,4			21,0	
<b>Dauer des Eingriffs</b>				
<b>Schnitt-Nahtzeit (in Minuten)</b>				
Anzahl der Patienten	4.556		5.685	
Median	80,0		80,0	
Minimum - Durchschnitt - Maximum	10,0	83,8	630,0	10,0
84,8			700,0	
<b>Zugang</b>				
anterolateral	1.619	35,5	2.213	38,9
lateral	1.667	36,6	2.167	38,1
transgluteal	1.038	22,8	1.047	18,4
posterior	230	5,0	260	4,57
transfemorale	1	0,02	1	0,02
andere	2	0,04	0	0,00
<b>Pfanne (Pfannenschale)</b>				
Anzahl der Patienten	4.557	100,0	5.688	100,0
davon				
zementfrei	3.532	77,5	4.576	80,4
zementiert	1.025	22,5	1.112	19,5
<b>Inlay</b>				
Anzahl der Patienten	3.631	79,7	4.557	80,1

	Gesamt 2001				Gesamt 2000	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
<b>Schaft</b>						
Anzahl der Patienten			4.557	100,0	5.688	100,0
davon						
zementfrei			2.649	58,1	3.617	63,6
zementiert			1.908	41,9	2.071	36,4
<b>Kopf</b>						
Anzahl der Patienten			4.557	100,0	5.688	100,0
davon						
Monoblock			284	6,2	410	7,2
Modular			4.273	93,8	5.278	92,8
<b>Zement</b>						
Anzahl der Pat. mit Antibiotika im Zement						
oder Kompressionstechnik			1.791	39,3	1.942	34,1
Antibiotika im Zement			1.535	33,7	1.716	30,2
Kompressionstechnik			1.417	31,1	1.378	24,2
<b>Knochen transplantation</b>						
Anzahl der Patienten			690	15,1	565	9,9
<b>Osteosynthese</b>						
Anzahl der Patienten			66	1,45	114	2,00

### Verlauf

	Gesamt 2001				Gesamt 2000	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
<b>Prothesenluxation</b>						
Anzahl der Patienten			54	1,18	55	0,97
<b>Postoperatives Röntgenbild a/p</b>						
Anzahl der Patienten			4.489	98,5	5.644	99,2
<b>Aufenthalt auf der Intensivstation</b>						
(in Stunden)						
Anzahl der Patienten			788		673	
Median			24,0		23,0	
Minimum - Durchschnitt - Maximum			1,0 26,5 400,0		1,0 25,6 400,0	
<b>Aufenthalt auf der Aufwach-/Wachstation</b>						
(in Stunden)						
Anzahl der Patienten			3.604		4.737	
Median			15,0		17,0	
Minimum - Durchschnitt - Maximum			1,0 14,9 99,0		1,0 15,5 99,0	
<b>Postop. Bewegungstherapie durch Krankengymnasten/Physiotherapeuten</b>						
Anzahl der Patienten			4.424	97,1	5.582	98,1
davon						
ab 1. postop. Tag			3.985	90,1	5.217	93,5
ab 2. postop. Tag			349	7,9	269	4,82
ab 3. postop. Tag			61	1,38	51	0,91
ab 4. postop. Tag			11	0,25	24	0,43
ab 5. postop. Tag			2	0,05	4	0,07
später			16	0,36	17	0,30
<b>Tägliche Bewegungstherapie</b>						
Anzahl der Patienten			4.497	98,7	5.642	99,2
<b>Allgemeine behandlungsbedürftige postoperative Komplikationen</b>						
Anzahl der Pat. mit mind. einer Komplikation			501	11,0	638	11,2
Pneumonie			20	0,44	20	0,35
kardiovaskuläre Komplikationen			62	1,36	77	1,35
tiefe Bein-/ Beckenvenenthrombose			21	0,46	31	0,55
Lungenembolie			4	0,09	19	0,33
Harnwegsinfekt			42	0,92	42	0,74
Wundinfektion/ Abszeßbildung			53	1,16	52	0,91
Wundhämatom/ Nachblutung			131	2,87	189	3,32
Gefäß- und/oder Nervenschäden			31	0,68	48	0,84
Dekubitus			50	1,10	46	0,81
Sonstige			147	3,23	178	3,13

**Entlassung**

	Gesamt 2001				Gesamt 2000	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
<b>Zustand bei Entlassung</b>						
<b>Beugefähigkeit über 70°</b>			4.250	93,3	5.256	92,4
<b>Volle Streckung</b>			4.262	93,5	5.273	92,7
<b>Belastung (in kg)</b>						
Anzahl der Patienten			4.423		5.501	
Median			60,0		50,0	
Minimum - Durchschnitt - Maximum			0,0	58,4 99,0	0,0	55,7 99,0
<b>Treppensteigen möglich (mit Gehstützen)</b>			4.462	97,9	5.605	98,5
Treppensteigen nicht möglich			95	2,08	83	1,46
davon operationsbedingt nicht möglich			30	32	19	23
<b>Selbst. Gehen möglich (mit Gehstützen)</b>			4.517	99,1	5.647	99,3
Selbständiges Gehen nicht möglich			40	0,88	41	0,72
davon operationsbedingt nicht möglich			4	10	10	24
<b>Selbständige Versorgung</b>						
<b>in der tgl. Hygiene möglich</b>			4.513	99,0	5.635	99,1
Selbständige Versorgung						
in der tgl. Hygiene nicht möglich			44	0,97	53	0,93
davon operationsbedingt nicht möglich			5	11	13	25
<b>Entlassungsgrund</b>						
1: Behandlung regulär beendet			3.056	67,1	3.340	58,7
2: Behandlung beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen			55	1,21	109	1,92
3: Behandlung aus sonst. Gründen beendet			10	0,22	29	0,51
4: Behandlung gegen ärztl. Rat beendet			1	0,02	1	0,02
5: Zuständigkeitswechsel d. Leistungsträger			39	0,86	2	0,04
6: Verlegung in ein anderes Krankenhaus			90	1,97	325	5,7
7: Tod			5	0,11	16	0,28
8: Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV95)			9	0,20	5	0,09
9: Entlassung in eine Rehabilitations- einrichtung			1.272	27,9	1.861	32,7
10: Entlassung in eine Pflegeeinrichtung			11	0,24	0	0,00
11: Entlassung in ein Hospiz			1	0,02	0	0,00
12: Interne Verlegung			8	0,18	0	0,00
Tod im Zusammenhang mit d. FP/SE oder der zugrundeliegenden Erkrankung (bez. auf verstorbene Pat.)			1	20	8	50
Sektion erfolgt (bez. auf verstorbene Pat.)			0	0	3	19

**Verteilung der Entlassungsgründe**

